

	種類	対象者	接種方法と接種間隔	備考
定期接種	ロタリックス (1価)	生後6週から24週未満 (初回接種は生後14週6日後まで)	27日以上の間隔をあけて2回接種	のむワクチンです どちらのワクチンも初 回接種は出生14週6日ま でに受けてください
	ロタテック (5価)	生後6週から32週未満 (初回接種は生後14週6日後まで)	27日以上の間隔をあけて3回接種	
	ヒブ	生後2か月から 5歳未満	初回：4週間以上の間隔をあけて3回 追加：3回目から7か月以上あけて1回	
	小児用肺炎球菌	生後2か月から 5歳未満	初回：4週間以上の間隔をあけて3回 追加：3回目から60日以上あけて1回	追加接種は1歳以上で接 種します
	4種混合 (DPT-IPV)	生後3か月から 7歳6か月未満	初回：3週間以上の間隔をあけて3回 追加：3回目終了後6か月以上あけて1回 (標準的には1年から1年6か月あけて)	ジフテリア、百日せ き、破傷風、ポリオの 混合ワクチンです
	B型肝炎	1歳未満	初回：4週間以上あけて2回 3回目：1回目から20週以上あけて1回	
	B C G	1歳未満	1回	推奨されている接種期 間は生後5か月から8か 月です。
	麻しん風しん 混合 (MR)	1期：1歳から2歳未満 2期：小学校就学前の1年間	1期：1回 2期：1回	
	水痘	1歳から3歳未満	3か月以上あけて2回 (標準的は6か月から1年以内)	
	日本脳炎 (第1期)	6か月 (標準は3歳) から 7歳6か月未満	初回：1週間以上の間隔をあけて2回 追加：2回目終了後6か月以上あけて (標準は概ね1年後)	
	2種混合 (D T)	11歳から13歳未満 乳幼児期に3種混合または (4種混合の1 期を終了している人が対象)	1回	ジフテリア、破傷風の 混合ワクチンです。
	日本脳炎 (第2期)	9歳以上13歳未満 (乳幼児期の1期が終了している人が対 象)	1回	
	日本脳炎 (特例)	①平成7年4月2日から平成19年4月1日生 まれて20歳未満の人 ②平成19年4月2日から平成21年10月1日 生まれて9歳から13歳未満の方	日本脳炎1期と2期の未接種のうち 未接種となっている回数	
	子宮頸がん	12歳から16歳になる年度末まで	3回 (接種間隔はワクチンの種類によって異なる)	
任意接種	おたふく	生後12か月から7歳未満で小学校就 学日の前日まで	1回目：生後1歳から3歳に至るまでの間に1回接種を する。 2回目：5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間に1回接種する。	