

令和7年度 長南町定期任意予防接種一覧

	種類	対象者	接種方法と接種間隔	備考
定期接種	ロタリックス (1価)	生後6週から24週未満 (初回接種は生後14週6日後まで)	27日以上の間隔をあけて2回	飲む生ワクチンです どちらのワクチンも初回接種は出生14週6日までに受けてください
	ロタテック (5価)	生後6週から32週未満 (初回接種は生後14週6日後まで)	27日以上の間隔をあけて3回	
	小児用肺炎球菌	生後2か月から5歳未満	初回：27日以上の間隔をあけて3回 追加：3回目から60日以上の間隔をあけて生後1歳以降に1回	追加接種は1歳以上で接種します
	5種混合 (DPT-IPV-Hib)	生後2か月から7歳6か月未満	初回：20～56日の間隔をあけて3回 追加：3回目終了後6か月以上あけて1回（標準的には1年から1年6か月）	ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブの混合ワクチンです
	B型肝炎	1歳未満	初回：27日以上あけて2回 3回目：1回目から139日以上あけて1回	
	B C G	1歳未満	1回(推奨されている接種期間は生後5か月から8か月です。)	
	麻しん風しん 混合（MR）	1期：1歳から2歳未満 2期：小学校就学前の1年間	1期：1回 2期：1回	
	水痘	1歳から3歳未満	3か月以上あけて2回（標準的には6か月から1年以内）	
	日本脳炎 (第1期)	6か月（標準は3歳）から7歳6か月未満	初回：6日以上の間隔をあけて2回（標準的には6日から28日まで） 追加：2回目終了後6か月以上あけて（標準的には概ね1年後）	
	2種混合 (DT)	11歳から13歳未満 (乳幼児期に3種混合または4種混合の1期を終了している人が対象)	1回	ジフテリア、破傷風の混合ワクチンです
任意接種	日本脳炎 (第2期)	9歳以上13歳未満 (乳幼児期に1期が終了している人が対象)	1回	
	子宮頸がん	12歳から16歳になる年度末まで	接種回数・接種間隔はワクチンの種類によって異なる	
	おたふく	1回目：1歳から3歳未満 2回目：小学校就学前の1年間	1回目：生後1歳から3歳に至るまでの間に1回 2回目：5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間に1回	
	インフルエンザ	生後6か月以上中学3年生以下	生後6か月～13歳未満：2～4週間程度の間隔をあけて2回 13歳以上の中学生：1回	